



# Degenerative Veränderungen an der Lendenwirbelsäule II

Information für Patienten



HOSPITAL ZUM HEILIGEN GEIST  
Kempen



## Information für Patienten über

- + die Ursache von Schmerzen in Kreuz und Bein
- + die Entstehung von Gefühlsstörungen und Muskelschwäche in den Beinen
- + die Behandlungsmöglichkeiten (konservativ und operativ)

## Inhalt

Die Entstehung von Symptomen: Schmerzen und Ausfälle	5
Die Behandlung bei Bandscheibenvorfällen und Wirbelkanaleinengungen an der Lendenwirbelsäule	9

## Liebe Patientin, lieber Patient,

Als Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie bieten wir Ihnen das komplette Spektrum der Wirbelsäulendiagnostik, der operativen, interventionellen und konservativen Therapie, sowie umfassende Nachbehandlungen an.

Dies erfolgt in einem engen interdisziplinären Dialog und Zusammenarbeit im Rahmen unseres muskuloskelettalen Zentrums mit der orthopädischen Abteilung und der schmerztherapeutischen Abteilung zusammen, um individuell für Sie den bestgeeigneten Behandlungsweg zu finden.

Neben der Klinikzertifizierung durch die Deutsche Wirbelsäulengesellschaft (DWG) sind die verantwortlichen Operateure zusätzlich mit dem Master Zertifikat der DWG ausgezeichnet.

Auf diese Weise möchten wir eine kompetente und kontinuierliche Betreuung unserer Patienten über den gesamten Behandlungsverlauf, vom ambulanten Beratungsgespräch über die Operation bis zur postoperativen Nachsorge, gewährleisten.



**Prof. Dr. Frank Floeth**  
Chefarzt Wirbelsäulenchirurgie



**Dr. Sascha Rhee**  
Chefarzt Wirbelsäulenchirurgie



**Dr. Angelika Hübner**  
Oberärztin Wirbelsäulenchirurgie



# Die Entstehung von Symptomen: Schmerzen und Ausfälle

## 1. Kreuzschmerzen

Sie entstehen hauptsächlich durch die Degeneration der Bandscheiben im vorderen Bereich der Wirbelsäule (bauchwärts) und der kleinen Wirbelgelenke im hinteren Bereich der Wirbelsäule (rückenwärts).

Durch die oben beschriebenen Alterungsprozesse mit zunehmendem Höhenverlust der Bandscheiben kommt es zu einer Störung der Statik der Lendenwirbelsäule (LWS) mit Steilstellung und aufgehobener Schwingung (Lordose) der Wirbelsäule. Der Höhenverlust der vorderen Wirbelsäulenanteile bewirkt eine zusätzliche Druckbelastung auf die kleinen Wirbelgelenke in den hinteren Bereichen. Die Folge ist ein beschleunigter Abrieb des Knorpels (Facettenarthrose). Dies führt zu lokalen Kreuzschmerzen, die ins Becken

und den Oberschenkel ausstrahlen können. Die Steilstellung der LWS bedingt eine vermehrte Muskelarbeit um den Oberkörper im Stehen gerade zu halten. Dadurch wird die Muskulatur chronisch überlastet und trägt so zusätzlich zu Kreuzschmerzen bei. Es besteht wie bei allen degenerativ veränderten Gelenken auch im Rücken ein typischer „Anlaufschmerz“, der nach Ruhephasen (morgens nach dem Aufstehen oder nach längerem Sitzen) zunächst besonders stark ist. Unter Belastung kommt es schmerzbedingt zu einer Verkürzung der Gehstrecke mit dem typischen Gefühl eines „Durchbrechschmerzes“. Die körperliche Belastung und Mobilität ist reduziert, der Schlaf ständig gestört und eine normale Arbeitsfähigkeit kann unmöglich werden.

---

## 2. Beinschmerzen ohne/mit neurologischen Ausfällen

Sie entstehen durch Druck auf eine Nervenwurzel seitlich im Wirbelkanal oder durch zentrale Einschnürungen des Spinalkanals.

Die MRT-Bilder unten auf Seite 6 zeigen einen großen Bandscheibenvorfall (rote Pfeile), der den Spinalkanal einengt und auf die Beinerven drückt.


Das Knorpelgewebe der Bandscheiben (Vorfälle) oder knöcherne Sporne (Osteophyten) führen also zu Irritationen an den Nervenwurzeln, indem sie diese verlagern oder quetschen. Dieser mechanische Druck auf die Nervenwurzel leitet die Schmerzen in

das Versorgungsgebiet des Nerven, also in die Beine weiter (zum Beispiel eine Lumboschialgie). Gleichzeitig können auch Rückenschmerzen (Lumbago) vorliegen, die aber nur indirekt etwas mit dem Bandscheibenvorfall oder dem engen Nervenkanal zu tun haben. Sie kommen vom begleitenden „Verschleiß“ im Rücken.

Wenn der Druck auf den Nerven sehr groß ist, können zusätzlich neurologische Ausfälle auftreten. Typischerweise zeigen sich Gefühlsstörungen mit Kribbelparästhesien, Taubheitsgefühlen und Muskelschwächen bis hin zu Lähmungen im betroffenen Bein.

Bei einem Bandscheibenvorfall (NPP), entstehen die Symptome in der Regel plötzlich. Häufig kann sich eine betroffene Person noch an den genauen Moment erinnern, als die Schmerzen im Bein begonnen haben. Eine vorherige Phase mit starken lokalen

Rückenschmerzen wird ebenfalls häufig beschrieben. Bei großem Druck auf den betroffenen Nerv kommt es hier schnell zu neurologischen Störungen, die mit den oben genannten Gefühlsstörungen bis hin zu Lähmungserscheinungen einher gehen können. Sehr große Vorfälle (Massenvorfall) beeinträchtigen sogar die Blasen- Darmfunktion und führen zu sexuellen Funktionsstörungen wie Erektionsstörungen oder Taubheit im Schambereich. Sie sind jedoch zum Glück extrem selten.



*Ein Bandscheibenvorfall, der nach oben in den Spinalkanal umgeschlagen ist (rote Pfeile).*


Während also ein Bandscheibenvorfall meist zu einem plötzlichen (akuten) Auftreten von Beschwerden führt, kommt es beim Anbau von knöchernen Spornen (Osteophyten) an den Wirbelkörpern zu einer langsamen Einengung und damit zu eher schleichend auftretenden und sich immer weiter verschlechternden (chronischen) Beschwerden.

Im Röntgen-Bild (Seitenaufnahme, linkes Bild, Seite 7) können die speziellen Veränderungen einer knöchernen Einengung eines Nervenaustrittskanals allenfalls erahnt werden

(blauer Pfeil). Das Computertomogramm (CT) zeigt im mittleren Bild auf Seite 7 eine hochgradige Einengung eines Nervenaustrittslochs (roter Pfeil) durch das Anwachsen von knöchernen Spornen mit entsprechendem Druck auf die dort austretende Nervenwurzel. In den angrenzenden Etagen und der Gegenseite zeigen sich normale Verhältnisse mit einer breiten Passage (grüne Pfeile) in den Austrittskanälen der Nervenwurzel. Im Bild ganz rechts auf Seite 7 wird im CT das ausreichend weite Nervenaustrittsloch der Gegenseite abgebildet (grüner Pfeil).



Röntgen der Lendenwirbelsäule seitlich



CT mit Darstellung der Nerven-Austrittskanäle rechts



CT mit Darstellung der Nerven-Austrittskanäle links

### 3. Claudicatio spinalis: Gangunsicherheit, neurologische Symptome und Schmerzen in beiden Beinen



Sie entstehen durch Druck auf das Nervenbündel (Cauda equina) mittig im Wirbelkanal. Durch breitbasige Bandscheibenverlagerungen, Wucherungen von Fasergewebe (Gelbes Band) und den Anbau knöcherner Sporne an den Wirbelkörpern und -gelenken, kann es zu einer zentralen Einengung des Wirbelkanals (Spinalkanalstenose) kommen. Häufig liegen die Ursachen in einer Kombination aus allen drei Faktoren.

In den MRT Bildern sieht man die Einschnürung der Nervenfasern in der Etage LWK 3/4 (rote Pfeile). Die Nerven werden auf Höhe der Enge fixiert. Ein indirektes Zeichen dafür ist die Verquirlung der Fasern darüber (rechtes Bild, blaue Pfeile).

Die Kompression der Nerven zeigt sich für den Patienten durch eine schleichend abneh-

mende Gehstrecke (Claudicatio spinalis). Sie geht einher mit Schwächegefühlen in den Beinen, gehstreckenabhängigen Schmerzen, Kribbeln und Taubheit. Insgesamt ein sehr vielfältiges Beschwerdebild das sich bei jedem Patienten etwas anders darstellt und mal das eine, dann das andere Symptom im Vordergrund steht. Allen ist jedoch gemein, dass die Gehstrecke langsam abnimmt und erst Besserung eintritt, wenn man stehen bleibt oder sich vornüber beugt. Fahrradfahren ist im Allgemeinen weiterhin gut möglich, ohne dass Symptome in den Beinen auftreten.

Schwerwiegende Symptome wie Lähmungen, Störungen der Blasen- und Darmkontrolle und sexuelle Funktionsverluste bei Mann und Frau sind sehr selten und entstehen mit wenigen Ausnahmen nicht plötzlich.



# Die Behandlung bei Bandscheibenvorfällen und Wirbelkanaleinengungen an der Lendenwirbelsäule


## Konservative Behandlung

Bei einer reinen Schmerzsymptomatik mit leichten Kribbelgefühlen wird im Allgemeinen zunächst eine konservative Behandlung über 6-8 Wochen empfohlen. Die Selbstheilung kann bei frischen, weichen Bandscheibenvorfällen durch Wasserverlust und Einschrumpfung erfolgen. Dies braucht allerdings einige Wochen bis Monate Zeit. Das Ziel der konservativen Therapie ist die Besserung des Schmerzbildes, so dass der Patient im Alltag wieder normal belastbar und arbeitsfähig wird. Die Möglichkeiten der konservativen Behandlung sind sehr vielfältig und wirken bei jedem Patienten unterschiedlich gut. Die gezielte CT- oder Röntgengesteuerte Spritzentherapie ist ein wichtiger Bestandteil der konservativen Maßnahmen und hilft, gerade in den Akutphasen der Krankheit, eine schnelle Besserung der Schmerzen zu erreichen.

Gelingt eine zufriedenstellende Linderung der Beschwerden, ist natürlich keine Operation notwendig. Nur weil ein Bandscheibenvorfall vorliegt, muss also noch lange nicht operiert werden.

Am Beispiel der hier gezeigten Kernspin-Bilder sieht man, dass sich Bandscheibenvorfälle zurückbilden können: Das linke Bild zeigt einen großen Bandscheibenvorfall (roter Pfeil). 5 Monate später ist er im Kontrollbild verschwunden.

Klingen die Schmerzen nicht zur Zufriedenheit ab oder bestehen neurologische Ausfälle und die Bildgebung zeigt einen die Beschwerden erklärenden Befund (z.B. Nachweis eines passenden Bandscheibenvorfalles im MRT), ist die Situation neu zu bewerten. Dann kann eine operative Lösung notwendig werden.



## Indikationen zur operativen Behandlung

**1.** Bei einem reinen Schmerzsyndrom mit hohem subjektiven Leidensdruck, welches nach 6-8 Wochen konservativer Behandlung (einschließlich radiologisch-gesteuerter Spritzentherapie) nicht abgeklungen ist, empfehlen wir eine Operation. Wenn man sehr lange wartet und die Schmerzen monatelang bestehen, kann es durch Veränderungen im Nervensystem selbst und im Schmerzzentrum des Gehirns zur Entwicklung eines chronischen Schmerzsyndroms kommen. Die Schmerzen bekommen dann oft einen brennenden Charakter und sind schließlich weder operativ noch medikamentös günstig zu beeinflussen. Um das zu verhindern, kann eine Operation notwendig werden.

Bei isolierten Rückenschmerzen ist die Entscheidung zur Operation sehr viel zurückhaltender zu stellen. Da die Gefahr einer Chronifizierung der Schmerzen hier nicht so hoch ist, kann deutlich länger konservativ behandelt werden.

**2.** Patienten mit Taubheitsgefühlen und einer Muskelschwäche (Lähmung) an den Beinen oder Füßen raten wir eher zu einer Operation, denn solche Ausfälle signalisieren eine Schädigung des Nervs durch den starken Druck. Bestehen diese Ausfälle länger, kann es zu einer bleibenden Schädigung des Nervs kommen und eine Erholung der Ausfälle ist dann trotz Operation häufig nicht mehr möglich.

**3.** Eine zunehmende Verkürzung der Gehstrecke, schmerzhaftes Ausstrahlen in die Beine und Taubheit können bei einer Enge im Nervenkanal (Spinalkanalstenose) eine Operation notwendig machen. Auch hier sind das Ausschöpfen der konservativen Maßnahmen und der individuelle Leidensdruck die wichtigsten Parameter, die eine Entscheidung zur operativen Befreiung des Nervenkanals beeinflussen.

**4.** Bei sehr großen Bandscheibenvorfällen, die mit Taubheit im Schambereich (Reithosenanästhesie), Störungen der Blasen- und Darmkontrolle sowie sexuellen Funktionsverlusten bei Mann und Frau einhergehen, handelt es sich um einen sehr seltenen aber schwerwiegenden Notfall, der sofort behandelt werden muss. Die aufgetretenen Ausfälle erholen sich oft nur sehr zögerlich und manchmal gar nicht. Eine schnelle Diagnostik mittels Kernspintomogramm (MRT) und eine zügige operative Behandlung bei entsprechendem Bildbefund sind hier entscheidend.

## Kontakt und Sprechstunden



**Lena Münnich**

Sekretariat

T 02152 142-502

F 02152 142-322

chirurgie-kem@artemed.de

### Indikationssprechstunde Wirbelsäulenchirurgie

Mo, 09.00 -12.00 Uhr und 13.00 -14.30 Uhr

**Dr. Sascha Rhee**

Di, 09.00 -12.00 Uhr und 13.00 -14.30 Uhr

**Dr. Angelika Hübner**

Mi, 09.00 - 12.00 Uhr

**Sahra Ostertag**

Do, 09.00 – 12.00 Uhr

### Halswirbelsäulen-Spezialsprechstunde

Fr, 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 14.30 Uhr

**Prof. Dr. Frank Floeth**

## **Hospital zum Heiligen Geist**

Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Düsseldorf  
Von-Broichhausen-Allee 1  
47906 Kempen

T 02152 142-0

F 02152 142-444

[info@krankenhaus-kempen.de](mailto:info@krankenhaus-kempen.de)

[\*\*www.krankenhaus-kempen.de\*\*](http://www.krankenhaus-kempen.de)